

Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich

Biuro Informacji i Spraw Publicznych

Waszyngton, DC 20207

DO NATYCHMIASTOWEGO ROZPOWSZECHNIENIA

12 marca 2010

Nr #10-165

CPSC Recall Hotline: (800) 638-2772

CPSC Media Contact: (301) 504-7908

**Odnotowano przypadki śmierci niemowląt – Ostrzeżenie CPSC dotyczące noszenia niemowląt w chustach**

Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) zwraca uwagę rodzicom i opiekunom korzystającym z chust do noszenia dzieci aby zachowali szczególną ostrożność przy noszeniu niemowląt w wieku do 4 miesiąca życia. Badając raporty z ostatnich 20 lat, CPSC zidentyfikowała i prześledziła przynajmniej 14 przypadków śmiertelnych, w tym 3 w 2009 r., spowodowanych noszeniem w nosidłach typu chusta. 12 przypadków dotyczyło niemowląt do 4 miesiąca życia.


Chusty mogą narazić niemowlęta na 2 różne typy uduszeń. W pierwszych miesiącach życia z powodu słabych mięśni szyi, niemowlę nie może kontrolować ułożenia główki. Materiał w chuście może uciskać nos i buzię dziecka uniemożliwiając oddychanie i powodując gwałtowne uduszenie w ciągu minuty lub dwóch. Dodatkowo, kiedy dziecko w chuście ułożone jest w skulonej pozycji i dotyka brodą klatki piersiowej, drożność dróg oddechowych jest ograniczona zmniejszając dostęp tlenu. Niemowlę nie będzie w stanie krzyknąć o pomoc i może się powoli udusić.

Wiele z przypadków śmierci w chustach dotyczyło bliźniąt z niską masą urodzeniową, wcześniaków oraz niemowląt z chorobami dróg oddechowych (np. przeziębienie). Dlatego CPSC namawia rodziców wcześniaków, bliźniąt, niemowląt z problemami zdrowotnymi i tych z niską wagą do szczególnej ostrożności i konsultacji z pediatrą odnośnie używania chust do noszenia.

Dwa miesiące temu Komisja dodała chusty do listy produktów dla niemowląt, które wymagają unormowania prawnego. Dodatkowo, pracownicy CPSC cały czas testują te produkty, aby ustalić, jakie dodatkowe kroki należy podjąć. Do momentu usankcjonowania prawnego CPSC będzie współpracowała z ASTM International, by jak najszybciej przygotować skuteczny, dobrowolny standard dla chust do noszenia dzieci.

CPSC radzi, aby rodzice i opiekunowie upewniali się, że twarz dziecka nie jest zasłonięta i jest widoczna przez cały czas noszenia w chuście. Jeśli dziecko jest karmione w chuście, należy zmienić jego pozycję po karmieniu i upewnić się, że główka dziecka jest w pionie nie jest zasłonięta materiałem chusty czy ciałem mamy. Rodzice i opiekunowie powinni być czujni i z dużą częstotliwością sprawdzać ułożenie dziecka w chuście.

CPSC jest zainteresowana wszystkimi zgłoszeniami dotyczącymi przypadków uszkodzeń ciała spowodowanych noszeniem dzieci w chustach. Zgłoszeń można dokonać za pośrednictwem strony [www.cpsc.gov/cgibin/incident.aspx](http://www.cpsc.gov/cgibin/incident.aspx) lub telefonicznie CPSC Hotline (800) 638-2772 (tylko na terytorium USA).



Rys.1. Dobrze: podbródek wzniesiony, twarz widoczna, nos i buzia nie zasłonięte

Rys. 2. Źle: Twarz dziecka jest zasłonięta

Rys. 3. Źle: Dziecko jest ułożone za nisko

Rys. 4. Źle: Dziecko jest zgarbione, podbródek dotyka klatki piersiowej

Rys. 5. Źle: Twarz dziecka jest przyciśnięta mocno do noszącego